

北海道がんセンター・化学療法レジメン一覧(令和5年4月14日現在)

| 診療科 | レジメンNo. | レジメン名 or 医薬品名 | 投与量 | 投与間隔 | |
|-----|---------|---------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | 消化器内科 | 消-1 | CDDP+CPT-11 | CDDP (80mg/m ² /d1), CPT-11 (70mg/m ² /d1,15) | 4週ごと |
| 1 | | 消-2 | CPT-11+LV+5-FU(IV)(IFL) | CPT-11 (125mg/m ² /d1,8,15,22), I-LV (20mg/m ² /d1,8,15,22), 5-FU(iv)(500mg/m ² /d1,8,15,22) | weekly × 4 /6週ごと |
| 1 | | 消-3 | CPT-11+LV+5-FU(FOLFIRI)(静注または動注)±Avastin | CPT-11 (150mg/m ² /d1), I-LV (200mg/m ² /d1), 5-FU(ci)(2400mg/m ² /d1), 5-FU(iv)(400mg/m ² /d1) ±Avastin 5mg/kg/d1 ※臨床試験の場合、CPT180mg/m ² のときあり | 2週ごと |
| 1 | | 消-4 | 5-FU | 5-FU(800mg/m ² /d1-5) | 4週ごと |
| 1 | | 消-5 | CDDP+Docetaxel+TS-1(DCS) | CDDP (60mg/m ² /d8), DTX (60mg/m ² /d8), TS-1 (80mg/m ² /d1-14) | 3週ごと |
| 1 | | 消-6 | CDDP+TS-1 | CDDP (60mg/m ² /d8), TS-1 (80mg/m ² /d1-14) | 4週ごと |
| 1 | | 消-7 | CPT-11+TS-1(IRIS) | CPT-11 (125mg/m ² /d1,15), TS-1 (80~120mg/日/d1-14) | 4週ごと |
| 1 | | 消-7' | CPT-11+TS-1(JACRO GC 05) | CPT-11 150mg/m ² (d1) +TS-1 80-120mg/body(d1-14) | 3週ごと |
| 1 | | 消-8 | Gemcitabine | GEM (1,000mg/m ² /d1,8,15) | 4週ごと |
| 1 | | 消-9 | Gemcitabine+5-FU(静注または動注) | GEM (1,000mg/m ² /d1,8,15), 5-FU (600mg/m ² /d1,8,15) | 4週ごと |
| 1 | | 消-10 | Gemcitabine+TS-1 | GEM (1,000mg/m ² /d8,15), TS-1 (60mg/m ² /d1-14) | 3週ごと |
| 1 | | 消-11 | Nedaplatin+Taxotere | 254-S (60mg/m ² /d1), DTX (60mg/m ² /d1) | 3週ごと |
| 1 | | 消-12 | Nedaplatin+5-FU | 254-S (100mg/m ² /d1), 5-FU (500mg/m ² /d1-5) | 4週ごと |
| 1 | | 消-13 | Oxaliplatin+5-FU+I-LV(FOLFOX4) | L-OHP (85mg/m ² /d1), 5-FU(ci) (600mg/m ² /d1,2), 5-FU(iv or ia) (400mg/m ² /d1,2), I-LV (200mg/m ² /d1,2) | 2週ごと |
| 1 | | 消-14 | Oxaliplatin+5-FU+I-LV(FOLFOX6)±Avastin | L-OHP (85mg/m ² /d1), 5-FU(ci) (2400mg/m ² /d1), 5-FU(iv or ia) (400mg/m ² /d1), I-LV (200mg/m ² /d1)±Avastin 5 or 10mg/kg | 2週ごと |
| 1 | | 消-15 | FLOX | L-OHP (85mg/m ² /d1,15,29), I-LV (250mg/m ² /d1,8,15,22,29,36),5-FU(bolus) (500mg/m ² /d1,8,15,22,29,36) | 8週ごと |
| 1 | | 消-16 | LV+5-FU(RPMI) | I-LV (250mg/m ² /d1,8,15,22,29,36), 5-FU(iv) (600mg/m ² /d1,8,15,22,29,36) | weekly × 6 /8週ごと |
| 1 | | 消-17 | 5-FU+I-LV(sLV5FU2) | 5-FU(iv) (400mg/m ² /d1), 5-FU(ci) (2,400~3,000mg/m ² /d1), I-LV (200mg/m ² /d1) | 2週ごと |
| 1 | | 消-18 | 5-FU+I-LV(AIO) | 5-FU(ci) (2,600mg/m ² /d1,8,15,22,29,36), I-LV (250mg/m ² /d1,8,15,22,29,36) | 8週ごと |
| 1 | | 消-19 | FP | 5-FU (300mg/m ² /d1-5), CDDP (5mg/body/d1-5) | 5投2休/週 |
| 1 | | 消-20 | Taxotere+Nedaplatin+5-FU(DNF) | DTX (50mg/m ² /d1), 254-S (60mg/m ² /d4), 5-FU (600mg/m ² /d1-5) | 4週ごと |
| 1 | | 消-21 | MTX+5-FU | MTX (100mg/m ² /d1), I-LV (10mg/m ² /d2, 6時間毎6回), 5-FU (600mg/m ² /d1) | 1週ごと |
| 1 | | 消-22 | Weekly Taxol | PTX (80mg/m ² /d1,8,15) | 4週ごと |
| 1 | | 消-23 | Taxotere+TS-1 | DTX (40mg/m ² /d1), TS-1 (80mg/m ² /d1-14) | 3週ごと |
| 1 | | 消-24 | Taxol+TS-1 | PTX (50mg/m ² /d1,8), TS-1 (80mg/m ² /d1-14) | 3週ごと |
| 1 | | 消-25 | Weekly Dose+高用量5-FU, I-LV併用療法 | DTX (25mg/m ² /d1,8,15), 5-FU (2,000mg/m ² /d1,8,15), I-LV (100mg/m ² /d1,8,15) | 4週ごと |
| 1 | | 消-26 | FOLFIRI+Eribitux | FOLFIRI+Eribitux初回400mg/m ² ,2回目以降250mg/m ² | FOLFIRI:2週ごと Eribitux:1週ごと |
| 1 | | 消-27 | Eribitux単独 | Eibitux初回400mg/m ² ,2回目以降250mg/m ² | 1週ごと |
| 1 | | 消-28 | 動注CDDP(アイエーコール) | アイエーコール65mg/m ² | 4-6週ごと |
| 1 | | 消-29 | 動注FP(5-FU+アイエーコール) | 5-FU 1500mg/m ² をd1-5とd15-20(5日間量)+CDDP45-65mg/m ² /d2 | 4週ごと |
| 1 | | 消-30 | Xelox ±Avastin | Xeloda 2400-4200mg/m ² (d1夕~d15朝)+I-OHP130mg/m ² (d1)±Avastin7.5mg/kg(d1) | 3週ごと |

May-09

May-09

北海道がんセンター・化学療法レジメン一覧(令和5年4月14日現在)

| 診療科 | レジメンNo. | レジメン名 or 医薬品名 | 投与量 | 投与間隔 | |
|-----|---------|---------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| 1 | 消-31 | 動注Gem+5-FU(臨床試験) | Gem1000mg/m ² (d1&15)ia +5-FU1500mg/m ² (d1-5&15-20) ia ※Gemはシリンジ投与 | 4週ごと | |
| 1 | 消-32 | TS-1+Oxaliplatin(SOX)+Avastin(SOFT試験) | TS-1 80-120mg/body/日 (d1夕~d15朝) + I-OHP130mg/m ² (d1) +BV7.5mg/kg(d1) | 3週ごと | |
| 1 | 消-33 | PTX腹腔内投与(患者限定) | PTX (80(60)mg/m ² /d1,8,15) | weekly | Jul-10 |
| 1 | 消-34 | Vectibix | Vectibix 6mg/kg | 2週ごと | Jul-10 |
| 1 | 消-35 | FOLFOX6+Vectibix | FOLFOX6 + Vectibix 6mg/kg(d1) | 2週ごと | Jul-10 |
| 1 | 消-36 | FOLFIRI+Vectibix | FOLFIRI + Vectibix 6mg/kg(d1) | 2週ごと | Jul-10 |
| 1 | 消-37 | FOLFOX6+Eribitux | FOLFOX6 + Eribitux初回400mg/m ² ,2回目以降250mg/m ² | FOLFOX:2週ごと Eribitux:1週ごと | Sep-10 |
| 1 | 消-38 | FOLFOX6+Eribitux(臨床試験:FLEET) | FOLFOX6 + Eribitux500mg/m ² | すべて2週ごと | |
| 1 | 消-39 | IRIS+Eribitux(臨床試験:HGCSG0902) | CPT-11 100mg/m ² (d1&15)+TS-1 80-120mg/日(d1-14)+Eribitux500mg/m ² (d1,15) | 4週ごと | |
| 1 | 消-40 | Xeloda+CDDP | Xeloda1000mg/m ² (d1夕~d15朝)+CDDP80mg/m ² (d1) | 3週ごと | |
| 1 | 消-41 | ハーセプチン | ハーセプチン8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)※他の化学療法と併用 | 3週ごと | |
| 1 | 消-42 | GEM+S-1+RT(臨床試験) | GEM 300mg/m ² (d1,8,22,29)※60分投与 +S-1 60mg/m ² (d1-14,22-35) +RT | 38日ごと | |
| 1 | 消-43 | XELOX+Cmab (biweekly) (臨床試験FLEET2) | I-OHP 85mg/m ² (d1) + Cmab 500mg/m ² (d1) + Xeloda 2000mg/m ² (d1-7) | 2週ごと | |
| 1 | 消-44 | DNF-R(臨床試験) | CDGP50mg/m ² (d1,8) + DOC20mg/m ² (d1,8) +5-FU 400mg/m ² (d1-5,8-12)+RT | 5週ごと × 2コース | |
| 1 | 消-45 | CDDP+GEM | CDDP25mg/m ² (d1,8) + GEM1000mg/m ² (d1,8) | 3週ごと | |
| 1 | 消-46 | FOLFIRINOX | I-OHP(85mg/m ² d1)、I-LV (200mg/m ² /d1)、CPT-11 (180mg/m ² /d1)、5-FU(ci)(2400mg/m ² /d1)、5-FU(iv)(400mg/m ² /d1) | 2週ごと | |
| 1 | 消-47 | XELOX+Pmab | I-OHP 130mg/m ² (d1) + Pmab 6mg/Kg(d1) + Xeloda 1000mg/m ² (d1-14) | 3週ごと | |
| 1 | 消-48 | SOX療法(胃がん) | TS-1 80-120mg/body/日 (d1~d14) + I-OHP100mg/m ² (d1) | 3週ごと | |
| 1 | 消-49 | SP3療法 | TS-1 80mg/m ² /day(day2-15) + CDDP 60mg/m ² (d2) | 3週ごと | |
| 1 | 消-50 | XELOX療法(胃がん) | I-OHP 130mg/m ² (d1) + Xeloda 2000mg/m ² (d1-14) | 3週ごと | |
| 1 | 消-51 | アブラキサン療法(胃がん) | nab-PAC260mg/m ² (d1) | 3週ごと | |
| 1 | 消-52 | アブラキサン+ジェムザール療法 | nab-PAC 125mg/m ² (d1,8,15) + Gem 1000mg/m ² (d1,8,15) | 4週ごと | |
| 1 | 消-53 | サイラムザ | サイラムザ 8mg/kg | 2週ごと | |
| 1 | 消-54 | FOLFIRI+サイラムザ | サイラムザ 8mg/kg(d1)+CPT-11 (150mg/m ² /d1)+I-LV (200mg/m ² /d1)+5-FU(ci)(2400mg/m ² /d1)+5-FU(iv)(400mg/m ² /d1) | 2週ごと | |
| 1 | 消-55 | Bi-weekly CPT-11 | CPT-11 (150mg/m ² /d1) | 2週ごと | |
| 1 | 消-56 | mFOLFIRINOX | I-OHP(85mg/m ² d1)、I-LV (200mg/m ² /d1)、CPT-11 (150mg/m ² /d1)、5-FU(ci)(2400mg/m ² /d1) | 2週ごと | |

北海道がんセンター・化学療法レジメン一覧(令和5年4月14日現在)

| 診療科 | レジメンNo. | レジメン名 or 医薬品名 | 投与量 | 投与間隔 |
|-----|---------|---------------------------------------|---|------|
| 1 | 消-57 | Weeklyアブラキサン | nab-PTX 100mg/m ² (d1.8.15) | 4週ごと |
| 1 | 消-58 | ザノサー(1~12週) | ザノサー1g/m ² (d1) | 1週ごと |
| 1 | 消-58 | ザノサー(13~18週) | ザノサー1.25g/m ² (d1) | 1週ごと |
| 1 | 消-58 | ザノサー(19週以降) | ザノサー1.5g/m ² (d1) | 1週ごと |
| 1 | 消-59 | IRIS+アバステン | BV (5mg/kg/d1,15), CPT-11 (100mg/m ² /d1,15)+TS-1 80-120mg/body/日(d1-14) | 4週ごと |
| 1 | 消-60 | SIRB | BV (7.5mg/kg/d1), CPT-11 (150mg/m ² /d1)+TS-1 80-120mg/body/日(d1-14) | 3週ごと |
| 1 | 消-61 | ロンサーフ+アバステン | BV (5mg/kg/d1,15)+ロンサーフ 35mg/m ² /回 1日2回(d1-5, d8-12) | 4週ごと |
| 1 | 消-62 | FOLFIRI+ザルトラップ | ザルトラップ4mg/kg + CPT-11 150mg/m ² + I-LV200mg/m ² + 5FU 400mg/m ² + 5FU 2400mg/m ² | 2週ごと |
| | 消-63 | nal-IRI+5FU/I-LV | nal-IRI (70mg/m ² , d1) + I-LV (200mg/m ² , d1) + 5FU (ci)(2400mg/m ² , d1-) | 2週ごと |
| 46 | 消-64 | エンハーツ(T-DXd)単独療法 | Trastuzumab Deruxtecan (6.4mg/kg, d1) | 3週ごと |
| | 消-65 | (免疫)テセントリク+アバステン | Atezolizumab (1200mg/Body, d1) + BV (15mg/kg, d1) | 3週ごと |
| | 消-66 | Encorafenib + Cetuximab | Encorafenib (300mg1日1回) + Cetuximab (初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ² , d1) | 1週ごと |
| | 消-67 | Encorafenib + Binimetinib + Cetuximab | Encorafenib (300mg1日1回) + Binimetinib (45mg/回 1日2回) + Cetuximab (初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ² , d1) | 1週ごと |
| 1 | 消-68 | (免疫)オブジーボ+ FOLFOX6 | オブジーボ(240mg/body/d1), L-OHP (85mg/m ² /d1), 5-FU(ci) (2400mg/m ² /d1), 5-FU(iv or ia) (400mg/m ² /d1), I-LV (200mg/m ² /d1) | 2週ごと |
| 1 | 消-69 | (免疫)オブジーボ+ CapeOX | オブジーボ(240mg/body,d1), I-OHP 130mg/m ² (d1) + Xeloda 2000mg/m ² (d1-14) | 3週ごと |
| 1 | 消-70 | (免疫)オブジーボ+ SOX | オブジーボ(240mg/body/d1), TS-1 80-120mg/body/日 (d1~d14) + I-OHP100mg/m2(d1) | 3週ごと |
| | 消-71 | (免疫)キイトルーダ+FP | キイトルーダ(200mg/body/d1), CDDP(80mg/m ² .d1), 5FU(800mg/m2.d1-5) | 3週ごと |
| | 消-72 | (免疫)キイトルーダ+5FU | キイトルーダ(200mg/body/d1), 5FU(800mg/m2.d1-5) | 3週ごと |
| 1 | 消-73 | (免疫)オブジーボ(食道癌 術後補助療法)240mg/b | オブジーボ(240mg/body/d1) | 2週ごと |
| 1 | 消-74 | (免疫)オブジーボ(食道癌 術後補助療法)480mg/b | オブジーボ(480mg/body/d1) | 4週ごと |
| 1 | 消-75 | パージェタ840mg+ハーセプチン8mg/kg(初回導入) | ペルツズマブ(840mg/body/d1)+トラスツズマブ(8mg/kg/d1) | 3週ごと |
| 1 | 消-76 | パージェタ420mg+ハーセプチン6mg/kg(2回目以降) | ペルツズマブ(420mg/body/d1)+トラスツズマブ(6mg/kg/d1) | 3週ごと |
| 1 | 消-77 | (免疫)オブジーボ+ヤーポイ(食道癌) | オブジーボ(360mg/body/d1,29)+ヤーポイ(1mg/kg/day1) | 6週ごと |
| 1 | 消-78 | CPT-11+サイラムザ(胃癌) | CPT-11(150mg/m ² /d1,15)+サイラムザ(8mg/kg/d1,15) | 4週ごと |
| | 消-79 | (免疫)GEM+CDDP+デュルバルマブ(胆道がん) | Gem(1000mg/m ² /d1,8)+CDDP(25mg/m ² /d1,8)+デュルバルマブ(1500mg/body/d1) | 3週ごと |
| | 消-80 | (免疫)デュルバルマブ(胆道がん) | デュルバルマブ(1500mg/body/d1) | 4週ごと |

北海道がんセンター・化学療法レジメン一覧(令和5年4月14日現在)

| 診療科 | レジメンNo. | レジメン名 or 医薬品名 | 投与量 | 投与間隔 |
|-----|---------|-------------------------|--|------|
| | 消-81 | DCF(NAC) 食道がん | GDDP (70mg/m ² /d1), DTX (70mg/m ² /d1), 5-FU (750mg/m ² /d1-5) | 3週ごと |
| | 消-82 | (免疫)トレメリムマブ+デュルバルマブ(肝癌) | トレメリムマブ(300mg/body/d1)+デュルバルマブ(1500mg/body/d1) | 4週ごと |
| | 消-83 | (免疫)デュルバルマブ(肝癌) | デュルバルマブ(1500mg/body/d1) | 4週ごと |