

患者名・生年月日

レジメン名・診療科

身長 148.5cm (2020/03/12) 体重 39.8kg (2020/04/07) 体表面積 1.255㎡ 種 ステージ ケル

投与歴

抗がん剤名(投与量)	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
処方薬(規格)用法用量	04/14	04/15	04/16	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25	04/26	04/27
(毒)キサリプラチン点滴静注液 100mg/20mL100mg(力価)	○													
(毒)キサリプラチン点滴静注液 50mg/10mL10mg(力価)	○													
アパシチン 点滴静注用 100mg/4mL200mg(力価)	○													
イリナカン塩酸塩 点滴静注液 100mg/190mg(力価)	○													
フルオロウラシル注 1000mg3100mg(力価)	○													
レボ・ホリナート 点滴静注用 25mg「ヤクルト」50mg(力価)	○													
レボ・ホリナート 点滴静注用 100mg「ヤクルト」200mg(力価)	○													

レジメン内容、抗がん薬の投与量、実施状況などが表示されます。

自覚症状

悪心
嘔吐
関節痛
末梢性感覚ニューロパシー
便秘
下痢
倦怠感
口腔粘膜炎
味覚異常
皮膚乾燥
手掌・足底発赤知覚不全症候群

副作用のグレード評価（CTCAE）
検査値の評価については、当日の検査データをもとにGradeを記載しています。
自覚症状の評価については、原則、前回から当日まで状態について確認した内容を記載しています。

貧血							1	1			1	2	2	
白血球減少							4	4	4	3	2			
好中球数減少							4	4	4	4	3			
血小板数減少								1	2	2	3	3	2	
アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ増加														
アラニンアミトランスフェラーゼ増加							1							
血中ビリルビン増加														
低アルブミン血症							2			3	3			
クレアチニン増加														

検査値

白血球数	04/13	6.79						0.50	0.30	0.39	1.03	2.01	4.23	8.57
好中球数	04/13							0.13	0.03	0.06	0.40	0.83		
ヘモグロビン値	04/13	10.9						11.4	11.3	10.8	9.6	10.3	8.9	9.1
血小板数	04/13	38.4										3	4.0	5.3
アルブミン値	04/13	3.1										9		
AST (GOT)	04/13	14										9		
ALT (GPT)	04/13	25										6		
総ビリルビン	04/13	0.51										50		
Na	04/13	134										33		
K	04/13	4.4										3		
Ca	04/13	8.6						7.9			7.8	7.7		
BUN														
クレアチン	04/13	0.62						0.40			0.37	0.45		
血糖	03/27	84								196				
HbA1c	12/25	7.4												
TSH														
Free-T3														

主な検査項目と検査値になります。